

Teste N.º 3

Matemática A

12.º Ano de Escolaridade

Nome do aluno: _____ N.º: __ Turma: __

Utilize apenas caneta ou esferográfica de tinta azul ou preta.

Não é permitido o uso de corretor. Risque aquilo que pretende que não seja classificado.

É permitido o uso de calculadora.

Apresente apenas uma resposta para cada item.

As cotações dos itens encontram-se no final do enunciado.

Na resposta aos itens de escolha múltipla, selecione a opção correta. Escreva na folha de respostas o número do item e a letra que identifica a opção escolhida.

Na resposta aos restantes itens, apresente todos os cálculos que tiver de efetuar e todas as justificações necessárias. Quando para um resultado não é pedida a aproximação, apresente sempre o valor exato.

Formulário

Geometria

Comprimento de um arco de circunferência

αr (α – amplitude, em radianos, do ângulo ao centro; r – raio)

Área de um polígono regular: Semiperímetro \times Apótema

Área de um setor circular:

$\frac{\alpha r^2}{2}$ (α – amplitude, em radianos, do ângulo ao centro; r – raio)

Área lateral de um cone: $\pi r g$ (r – raio da base;

g – geratriz)

Área de uma superfície esférica: $4 \pi r^2$ (r – raio)

Volume de uma pirâmide: $\frac{1}{3} \times$ Área da base \times Altura

Volume de um cone: $\frac{1}{3} \times$ Área da base \times Altura

Volume de uma esfera: $\frac{4}{3} \pi r^3$ (r – raio)

Progressões

Soma dos n primeiros termos de uma progressão (u_n)

Progressão aritmética: $\frac{u_1 + u_n}{2} \times n$

Progressão geométrica: $u_1 \times \frac{1 - r^n}{1 - r}$

Trigonometria

$\sin(a + b) = \sin a \cos b + \sin b \cos a$

$\cos(a + b) = \cos a \cos b - \sin a \sin b$

Complexos

$(\rho e^{i\theta})^n = \rho^n e^{in\theta}$

$\sqrt[n]{\rho e^{i\theta}} = \sqrt[n]{\rho} e^{i\frac{\theta + 2k\pi}{n}}$ ($k \in \{0, \dots, n - 1\}$ e $n \in \mathbb{N}$)

Regras de derivação

$(u + v)' = u' + v'$

$(u \cdot v)' = u' \cdot v + u \cdot v'$

$\left(\frac{u}{v}\right)' = \frac{u' \cdot v - u \cdot v'}{v^2}$

$(u^n)' = n \cdot u^{n-1} \cdot u'$ ($n \in \mathbb{R}$)

$(\sin u)' = u' \cdot \cos u$

$(\cos u)' = -u' \cdot \sin u$

$(\operatorname{tg} u)' = \frac{u'}{\cos^2 u}$

$(e^u)' = u' \cdot e^u$

$(a^u)' = u' \cdot a^u \cdot \ln a$ ($a \in \mathbb{R}^+ \setminus \{1\}$)

$(\ln u)' = \frac{u'}{u}$

$(\log_a u)' = \frac{u'}{u \cdot \ln a}$ ($a \in \mathbb{R}^+ \setminus \{1\}$)

Limites notáveis

$\lim \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n = e$ ($n \in \mathbb{N}$)

$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x} = 1$

$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x - 1}{x} = 1$

$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln x}{x} = 0$

$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{e^x}{x^p} = +\infty$ ($p \in \mathbb{R}$)

1. Um saco contém seis bolas amarelas e oito bolas brancas, indistinguíveis ao tato. Cada bola tem uma única cor e só existem bolas amarelas e bolas brancas no saco.

Pretende-se colocar todas estas bolas em onze caixas numeradas de 1 a 11, de tal forma que:

- cada caixa com um número primo tenha, pelo menos, uma bola amarela;
- cada caixa com um número não primo tenha, pelo menos, uma bola branca.

Nestas condições, de quantas maneiras diferentes podem ser colocadas as quinze bolas nas onze caixas?

(A) 616 (B) 726 (C) 1221 (D) 40 656

2. A soma de todos os elementos de uma dada linha do triângulo de Pascal é igual a 32 768.

Qual é o valor do maior elemento da linha seguinte?

(A) 6435 (B) 11 440 (C) 12 870 (D) 24 310

3. De uma turma de 12.º ano, sabe-se que:

- há alunos inscritos nas disciplinas de Aplicações Informáticas e de Biologia, entre outras disciplinas opcionais;
- 20% dos alunos não está inscrito nem em Aplicações Informáticas nem em Biologia.

3.1. Relativamente aos alunos dessa turma, sabe-se ainda que:

- $\frac{1}{13}$ dos alunos inscritos em Biologia também estão inscritos em Aplicações Informáticas;
- em cada 4 alunos inscritos em Aplicações Informáticas, 1 está inscrito em Biologia.

Escolhe-se, ao acaso, um aluno da turma.

Determine a probabilidade de esse aluno estar matriculado nas duas disciplinas opcionais (Aplicações Informáticas e Biologia).

Apresente o resultado na forma de fração irredutível.

3.2. Considere agora que a turma tem 20 alunos.

Escolhem-se, ao acaso, quatro alunos dessa turma.

Determine a probabilidade de, entre esses alunos, haver no mínimo três que estão inscritos em Aplicações Informáticas ou Biologia.

Apresente o resultado com aproximação às milésimas.

4. Seja f a função, de domínio \mathbb{R} , definida por:

$$f(x) = \begin{cases} \frac{2x^2 - 2x - 12}{x^2 - 3x} & \text{se } x > 3 \\ k & \text{se } x = 3, \text{ onde } k \in \mathbb{R} \\ \frac{5 - \sqrt{16 + x^2}}{3 - x} & \text{se } x < 3 \end{cases}$$

Resolva os itens seguintes, sem recorrer à calculadora.

4.1. Qual é a equação reduzida da reta tangente ao gráfico de f no ponto de abscissa 4?

(A) $y = -\frac{1}{4}x + 3$

(B) $y = -\frac{1}{4}x + 4$

(C) $y = \frac{14}{5}x + 3$

(D) $y = \frac{14}{5}x - \frac{41}{5}$

4.2. Mostre que não existe nenhum valor real k para o qual a função f seja contínua em $x = 3$.

4.3. Estude a função f quanto à existência de assíntotas horizontais ao seu gráfico e, caso existam, escreva as respectivas equações.

5. Seja f a função definida, em \mathbb{R}^+ , por $f(x) = \ln(x)$.

Seja (u_n) a sucessão de termo geral $u_n = \frac{a}{n} + \left(\frac{n+a}{n}\right)^n$, onde a é um número natural.

A que é igual $\lim f(u_n)$?

(A) a

(B) $a + 1$

(C) e^a


(D) $\ln a$

6. Seja a um número real positivo.

Na figura está representada, num referencial o.n. Oxy , parte do gráfico da função f definida, em $]-\infty, \frac{2}{a}[$, por $f(x) = a + \ln(2 - ax)$.

Sabe-se que:

- o ponto A pertence ao gráfico de f e ao eixo Oy ;
- o ponto B pertence ao gráfico de f e ao eixo Ox ;
- o ponto O é a origem do referencial.



Mostre, por processos exclusivamente analíticos, que existe, pelo menos, um número real a , pertencente ao intervalo $]\frac{1}{2}, 1[$, para o qual o triângulo $[AOB]$ é isósceles.

Se utilizar a calculadora, em eventuais cálculos numéricos, sempre que proceder a arredondamentos, conserve três casas decimais.

7. Ao largo da costa portuguesa, um petroleiro encalhou e começou a derramar crude. Admita que a área S , em quilómetros quadrados, da mancha de crude no oceano, t horas após o instante em que o derrame foi detetado, é dada por:

$$S(t) = \frac{20t^3 + t\sqrt{t} + 1}{0,2t^3 + 10\sqrt{t} + 1}, \text{ com } 0 \leq t \leq 24$$

- 7.1. Qual é, com aproximação às unidades, a percentagem de aumento da área da mancha de crude no oceano, na primeira hora após o derrame ter sido detetado?

(A) 96% (B) 196% (C) 49% (D) 149%

- 7.2. Existe um instante t_1 , a partir do qual, passadas duas horas, a área da mancha de crude triplicou.

Determine, recorrendo à calculadora, o valor desse instante t_1 , sabendo-se que existe e é único. Apresente o resultado em horas e minutos (com os minutos arredondados às unidades). Não justifique a validade do resultado obtido na calculadora.

Na sua resposta:

- apresente uma equação que lhe permita resolver o problema;
- reproduza, num referencial, o(s) gráfico(s) da(s) função(ões) visualizado(s) na calculadora que lhe permite(m) resolver a equação;
- apresente a(s) coordenada(s) do(s) ponto(s) relevante(s) arredondada(s) às milésimas.

8. Seja g a função, de domínio $\mathbb{R} \setminus \{0\}$, definida por:

$$g(x) = \begin{cases} 2023x - 2\cos^2 x + 2 & \text{se } x < 0 \\ \frac{5e^{2x}}{2} - 11e^x + x - \ln 2 & \text{se } x > 0 \end{cases}$$

Resolva os itens seguintes sem recorrer à calculadora.

- 8.1. Estude a função g quanto ao sentido das concavidades do seu gráfico e quanto à existência de pontos de inflexão no intervalo $]-\pi, 0[$.

Na sua resposta, apresente:

- o(s) intervalo(s) em que o gráfico de f tem a concavidade voltada para baixo;
- o(s) intervalo(s) em que o gráfico de f tem a concavidade voltada para cima;
- a(s) abcissa(s) do(s) ponto(s) de inflexão do gráfico de g , caso exista(m).

- 8.2. Considere, em referencial o.n. Oxy , o gráfico da função g .

Considere, no intervalo $]0, +\infty[$, o ponto A , ponto do gráfico da função g em que a reta tangente ao gráfico da função é paralela à bissetriz dos quadrantes pares.

Mostre que a ordenada do ponto A é -12 .

9. Seja k um número real não nulo, e seja f a função definida, em \mathbb{R}^+ , por $f(x) = kx^2$.

Considere dois pontos A e B do gráfico de f , sendo A o ponto de menor abscissa.

Considere, também, o ponto desse gráfico em que a reta tangente ao gráfico é paralela à reta AB .

Mostre que, para qualquer valor de k , as abscissas dos três pontos são termos consecutivos de uma progressão aritmética.

FIM

COTAÇÕES

| Item | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------|----|-----|-----|-----|-----|-----|----|----|-----|-----|-----|-----|----|------------|
| Cotação (em pontos) | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | 2. | 3.1 | 3.2 | 4.1 | 4.2 | 4.3 | 5. | 6. | 7.1 | 7.2 | 8.1 | 8.2 | 9. | Total |
| 10 | 10 | 16 | 16 | 10 | 16 | 16 | 10 | 16 | 10 | 18 | 16 | 18 | 18 | 200 |

TESTE N.º 3 – Proposta de resolução

1. Opção (B)

Os números primos de 1 a 11 são: 2, 3, 5, 7 e 11.

Começamos por colocar uma bola amarela em cada uma das cinco caixas com um número primo e fica a sobrar uma bola amarela. Depois, colocamos uma bola branca em cada uma das seis caixas com um número não primo e ficam a sobrar duas bolas brancas.

1.º Processo

Existem 2 casos mutuamente exclusivos de maneira a colocar as 3 bolas restantes:

- as bolas brancas que sobram ficam juntas e a bola amarela fica em qualquer caixa: 11×11 maneiras;
- as bolas brancas que sobram ficam separadas e a bola amarela fica em qualquer caixa: ${}^{11}C_2 \times 11$.

Assim, o número pedido é igual a:

$$11 \times 11 + {}^{11}C_2 \times 11 = 726$$

2.º Processo

Existem 4 casos mutuamente exclusivos de maneira a colocar as 3 bolas restantes:

- as bolas que sobram ficam todas juntas numa mesma caixa: 11 maneiras;
- a bola amarela que sobra fica separada e as bolas brancas que sobram ficam juntas: 11×10 maneiras;
- a bola amarela que sobra fica na mesma caixa com uma e uma só bola branca e a outra bola branca fica separada: 11×10 maneiras;
- as bolas que sobram ficam todas separadas: $11 \times {}^{10}C_2$ maneiras.

Assim, o número pedido é igual a $11 + 11 \times 10 + 11 \times 10 + 11 \times {}^{10}C_2 = 726$.

2. Opção (C)

Se a soma de todos os elementos de uma linha n do triângulo de Pascal é igual a 32 768, então:

$$2^n = 32\,768 \Leftrightarrow 2^n = 2^{15} \Leftrightarrow n = 15$$

A linha seguinte é a linha de ordem 16 e o maior elemento dessa linha é igual a ${}^{16}C_8 = 12\,870$.

3. Consideremos os acontecimentos:

A: “O aluno estar inscrito em Aplicações Informáticas.”

B: “O aluno estar inscrito em Biologia.”

Sabe-se que:

$$P(\bar{A} \cap \bar{B}) = \frac{1}{5} \Leftrightarrow P(\overline{A \cup B}) = \frac{1}{5} \Leftrightarrow 1 - P(A \cup B) = \frac{1}{5} \Leftrightarrow P(A \cup B) = \frac{4}{5}$$

3.1. Sabe-se ainda que:

$$P(A|B) = \frac{1}{13} \Leftrightarrow \frac{P(A \cap B)}{P(B)} = \frac{1}{13} \Leftrightarrow P(A \cap B) = \frac{1}{13}P(B) \Leftrightarrow P(B) = 13P(A \cap B)$$

$$P(B|A) = \frac{1}{4} \Leftrightarrow \frac{P(A \cap B)}{P(A)} = \frac{1}{4} \Leftrightarrow P(A \cap B) = \frac{1}{4}P(A) \Leftrightarrow P(A) = 4P(A \cap B)$$

Como $P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$, então:

$$\frac{4}{5} = 4P(A \cap B) + 13P(A \cap B) - P(A \cap B) \Leftrightarrow \frac{4}{5} = 16P(A \cap B) \Leftrightarrow \frac{4}{80} = P(A \cap B) \Leftrightarrow P(A \cap B) = \frac{1}{20}$$

3.2. $\frac{4}{5} \times 20 = 16$ é número de alunos que está inscrito em Aplicações Informáticas ou em

Biologia. A probabilidade pedida é igual a $\frac{{}^{16}C_3 \times {}^4C_1 + {}^{16}C_4}{{}^{20}C_4} = \frac{4060}{4845} \approx 0,838$.

4.

4.1. Opção (B)

Em $]0, +\infty[$, tem-se que:

$$f'(x) = \left(\frac{2x^2 - 2x - 12}{x^2 - 3x} \right)' = \frac{(2x^2 - 2x - 12)' \times (x^2 - 3x) - (2x^2 - 2x - 12) \times (x^2 - 3x)'}{(x^2 - 3x)^2} =$$

$$= \frac{(4x - 2) \times (x^2 - 3x) - (2x^2 - 2x - 12) \times (2x - 3)}{(x^2 - 3x)^2}$$

$$f'(4) = \frac{(16 - 2) \times (16 - 12) - (2 \times 16 - 2 \times 4 - 12) \times (8 - 3)}{(16 - 12)^2} = \frac{-4}{16} = -\frac{1}{4}$$

Assim, a equação reduzida da reta pretendida é da forma $y = -\frac{1}{4}x + b$.

O ponto de coordenadas $(4, f(4)) = (4, 3)$ pertence à reta e, assim, tem-se que:

$$3 = -\frac{1}{4} \times 4 + b \Leftrightarrow b = 3 + 1$$

$$\Leftrightarrow b = 4$$

Cálculo auxiliar

$$f(4) = \frac{2 \times 4^2 - 2 \times 4 - 12}{4^2 - 3 \times 4} = \frac{12}{4} = 3$$

A equação reduzida da reta tangente ao gráfico de f no ponto de abcissa 4 é $y = -\frac{1}{4}x + 4$.

4.2. Para f ser contínua em $x = 3$, terá de se verificar $\lim_{x \rightarrow 3^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow 3^-} f(x) = f(3) = k$.

$$\bullet \lim_{x \rightarrow 3^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow 3^+} \frac{2x^2 - 2x - 12}{x^2 - 3x} =$$

$$= \lim_{x \rightarrow 3^+} \frac{2(x-3)(x+2)}{x(x-3)} =$$

$$= \lim_{x \rightarrow 3^+} \frac{2(x+2)}{x} =$$

$$= \frac{2 \times (3+2)}{3} = \frac{10}{3}$$

Cálculo auxiliar

$$2x^2 - 2x - 12 = 0 \Leftrightarrow x = \frac{2 \pm \sqrt{(-2)^2 - 4 \times 2 \times (-12)}}{2 \times 2} \Leftrightarrow x = \frac{2 \pm \sqrt{100}}{4}$$

$$\Leftrightarrow x = 3 \vee x = -2$$

$$2x^2 - 2x - 12 = 2(x - 3)(x + 2)$$

$$\begin{aligned}
\bullet \lim_{x \rightarrow 3^-} f(x) &= \lim_{x \rightarrow 3^-} \frac{5 - \sqrt{16+x^2}}{3-x} = \lim_{x \rightarrow 3^-} \frac{(5 - \sqrt{16+x^2})(5 + \sqrt{16+x^2})}{(3-x)(5 + \sqrt{16+x^2})} = \\
&= \lim_{x \rightarrow 3^-} \frac{(5)^2 - (\sqrt{16+x^2})^2}{(3-x)(5 + \sqrt{16+x^2})} = \\
&= \lim_{x \rightarrow 3^-} \frac{25 - (16+x^2)}{(3-x)(5 + \sqrt{16+x^2})} = \\
&= \lim_{x \rightarrow 3^-} \frac{25 - 16 - x^2}{(3-x)(5 + \sqrt{16+x^2})} = \\
&= \lim_{x \rightarrow 3^-} \frac{9 - x^2}{(3-x)(5 + \sqrt{16+x^2})} = \\
&= \lim_{x \rightarrow 3^-} \frac{(3-x)(3+x)}{(3-x)(5 + \sqrt{16+x^2})} = \\
&= \lim_{x \rightarrow 3^-} \frac{3+x}{5 + \sqrt{16+x^2}} = \\
&= \frac{3+3}{5 + \sqrt{16+3^2}} = \\
&= \frac{6}{5+5} = \\
&= \frac{6}{10} = \\
&= \frac{3}{5}
\end{aligned}$$

Como $\lim_{x \rightarrow 3^+} f(x) \neq \lim_{x \rightarrow 3^-} f(x)$, verifica-se que a função f não é contínua em $x = 3$, independentemente do valor de k . Conclui-se, assim, que não existe um valor real k para o qual a função f seja contínua em $x = 3$.

4.3. Como a função f tem domínio \mathbb{R} , temos de estudar as assíntotas horizontais ao gráfico de f , para $x \rightarrow -\infty$ e para $x \rightarrow +\infty$.

- $x \rightarrow +\infty$

$$\begin{aligned}
\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) &= \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{2x^2 - 2x - 12}{x^2 - 3x} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^2 \left(2 - \frac{2}{x} - \frac{12}{x^2} \right)}{x^2 \left(1 - \frac{3}{x} \right)} = \\
&= \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{2 - \frac{2}{x} - \frac{12}{x^2}}{1 - \frac{3}{x}} = \\
&= \frac{2 - 0 - 0}{1 - 0} = \\
&= 2
\end{aligned}$$

Assim, a reta de equação $y = 2$ é assíntota horizontal ao gráfico da função f , quando $x \rightarrow +\infty$.

- $x \rightarrow -\infty$

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{5 - \sqrt{16+x^2}}{3-x} = \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{5 - \sqrt{x^2 \left(\frac{16}{x^2} + 1 \right)}}{3-x} =$$

$$\begin{aligned}
&= \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{5 - |x| \sqrt{\frac{16}{x^2} + 1}}{3 - x} = \\
&= \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{5 - (-x) \sqrt{\frac{16}{x^2} + 1}}{3 - x} = \\
&= \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{x \left(\frac{5}{x} + \sqrt{\frac{16}{x^2} + 1} \right)}{x \left(\frac{3}{x} - 1 \right)} = \\
&= \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{\frac{5}{x} + \sqrt{\frac{16}{x^2} + 1}}{\frac{3}{x} - 1} = \\
&= \frac{0 + \sqrt{0 + 1}}{0 - 1} = \\
&= -1
\end{aligned}$$

Portanto, a reta de equação $y = -1$ é assíntota horizontal ao gráfico da função f , quando $x \rightarrow -\infty$.

5. Opção (A)

$$\lim u_n = \lim \left[\frac{a}{n} + \left(\frac{n+a}{n} \right)^n \right] = \lim \frac{a}{n} + \lim \left(1 + \frac{a}{n} \right)^n = 0 + e^a = e^a$$

$$\text{Assim, } \lim f(u_n) = \lim_{x \rightarrow e^a} f(x) = \ln e^a = a.$$

6. Tem-se que $a \in \mathbb{R}^+$, $A(0, f(0))$ e $B(b, 0)$.

Como $f(0) = a + \ln(2)$, então $A(0, a + \ln(2))$.

A solução da equação $f(x) = 0$, dá-nos o valor de b , abcissa do ponto B .

$$f(x) = 0 \Leftrightarrow$$

$$\begin{aligned}
\Leftrightarrow a + \ln(2 - ax) = 0 &\Leftrightarrow \ln(2 - ax) = -a \Leftrightarrow 2 - ax = e^{-a} \\
&\Leftrightarrow -ax = e^{-a} - 2 \\
&\Leftrightarrow x = \frac{2 - e^{-a}}{a}
\end{aligned}$$

Assim, concluímos que $B\left(\frac{2 - e^{-a}}{a}, 0\right)$.

O triângulo $[AOB]$ é isósceles se e só se:

$$\overline{OA} = \overline{OB} \Leftrightarrow a + \ln(2) = \frac{2 - e^{-a}}{a} \Leftrightarrow a + \ln(2) - \frac{2 - e^{-a}}{a} = 0$$

Consideremos a função g , de domínio \mathbb{R}^+ , definida por $g(x) = x + \ln(2) - \frac{2 - e^{-x}}{x}$.

- g é uma função contínua por se tratar da diferença entre duas funções contínuas e, em particular, g é contínua em $\left[\frac{1}{2}, 1\right]$.

- $g\left(\frac{1}{2}\right) = \frac{1}{2} + \ln(2) - \frac{2 - e^{-\frac{1}{2}}}{\frac{1}{2}} = \frac{1}{2} + \ln(2) - 4 + 2e^{-\frac{1}{2}} \approx -1,594$
- $g(1) = 1 + \ln(2) - \frac{2 - e^{-1}}{1} = 1 + \ln(2) - 2 + \frac{1}{e} = -1 + \ln(2) + \frac{1}{e} \approx 0,061$

Tem-se que $g\left(\frac{1}{2}\right) < 0 < g(1)$.

Logo, pelo teorema de Bolzano-Cauchy, concluímos que:

$$\exists c \in \left] \frac{1}{2}, 1 \right[: g(c) = 0, \text{ ou seja, } \exists c \in \left] \frac{1}{2}, 1 \right[: c + \ln(2) - \frac{2 - e^{-c}}{c} = 0$$

o que significa que existe, pelo menos, um número real a , pertencente ao intervalo $\left] \frac{1}{2}, 1 \right[$, para o qual o triângulo $[AOB]$ é isósceles.

7.


7.1. Opção (A)

Temos que $S(0) = 1$ e $S(1) = \frac{22}{11,2}$, logo $\frac{S(1) - S(0)}{S(0)} \times 100 \approx 96\%$.

7.2. A equação que traduz o problema é $S(t + 2) = 3 S(t)$, $t \in [0, 22]$.

Usando x como variável independente:

$$f_1(x) = \frac{20(x+2)^3 + (x+2)\sqrt{x+2} + 1}{0,2(x+2)^3 + 10\sqrt{x+2} + 1} \quad f_2(x) = 3 \times \frac{20x^3 + x\sqrt{x} + 1}{0,2x^3 + 10\sqrt{x} + 1}$$



$$t \approx 2,405$$

$$0,405 \times 60 \approx 24$$

O instante a partir do qual, passadas duas horas, a área da mancha de crude triplicou foi às 2 horas e 24 minutos.

8.

8.1. Em $]-\pi, 0[$, tem-se que:

$$\begin{aligned} g'(x) &= (2023x - 2\cos^2 x + 2)' = 2023 - 2 \times 2 \times \cos x \times (-\operatorname{sen} x) = \\ &= 2023 + 2 \times 2 \times \operatorname{sen} x \times \cos x = \\ &= 2023 + 2\operatorname{sen}(2x) \end{aligned}$$

$$g''(x) = (2023 + 2\operatorname{sen}(2x))' = 2 \times 2 \cos(2x) = 4 \cos(2x)$$

$$g''(x) = 0$$

$$4 \cos(2x) = 0 \Leftrightarrow \cos(2x) = 0 \Leftrightarrow 2x = \frac{\pi}{2} + k\pi, k \in \mathbb{Z}$$

$$\Leftrightarrow x = \frac{\pi}{4} + \frac{k\pi}{2}, k \in \mathbb{Z}$$

Em $]-\pi, 0[$, os zeros de g'' são $-\frac{\pi}{4}$ e $-\frac{3\pi}{4}$.

| | | | | | | | |
|--|--------|---|-------------------|---|------------------|---|-----|
| x | $-\pi$ | | $-\frac{3\pi}{4}$ | | $-\frac{\pi}{4}$ | | 0 |
| Sinal de g'' | | + | 0 | - | 0 | + | |
| Sentido das concavidades do gráfico de g | | U | P.I. | ∩ | P.I. | U | |

Cálculos auxiliares

$$g''\left(-\frac{5\pi}{6}\right) = 4 \cos\left(-\frac{10\pi}{6}\right) = 4 \cos\left(-\frac{5\pi}{3}\right) = 4 \times \frac{1}{2} = 2 > 0$$

$$g''\left(-\frac{\pi}{2}\right) = 4 \cos\left(-\frac{2\pi}{2}\right) = 4 \cos(-\pi) = 4 \times (-1) = -4 < 0$$

$$g''\left(-\frac{\pi}{6}\right) = 4 \cos\left(-\frac{2\pi}{6}\right) = 4 \cos\left(-\frac{\pi}{3}\right) = 4 \times \frac{1}{2} = 2 > 0$$

O gráfico da função g tem a concavidade voltada para cima em $]-\pi, -\frac{3\pi}{4}]$ e em $[-\frac{\pi}{4}, 0[$ e a concavidade voltada para baixo em $[-\frac{3\pi}{4}, -\frac{\pi}{4}]$; tem dois pontos de inflexão de abscissas $-\frac{3\pi}{4}$ e $-\frac{\pi}{4}$.

8.2. Em $]0, +\infty[$: $g'(x) = \left(\frac{5e^{2x}}{2} - 11e^x + x - \ln(2)\right)' = \frac{5}{2} \times 2e^{2x} - 11e^x + 1 = 5e^{2x} - 11e^x + 1$

Para que a reta tangente ao gráfico de g seja paralela à bissetriz dos quadrantes pares, o seu declive deverá ser igual a -1 .

Assim, a abcissa do ponto A verifica a condição:

$$g'(x) = -1 \Leftrightarrow 5e^{2x} - 11e^x + 1 = -1 \Leftrightarrow 5(e^x)^2 - 11e^x + 2 = 0$$

$$\Leftrightarrow e^x = \frac{-(-11) \pm \sqrt{(-11)^2 - 4 \times 5 \times 2}}{2 \times 5}$$

$$\Leftrightarrow e^x = \frac{11 \pm \sqrt{81}}{10}$$

$$\Leftrightarrow e^x = \frac{11 \pm 9}{10}$$

$$\Leftrightarrow e^x = \frac{11+9}{10} \vee e^x = \frac{11-9}{10}$$

$$\Leftrightarrow e^x = 2 \vee e^x = \frac{1}{5}$$

$$\Leftrightarrow x = \ln(2) \vee x = \ln\left(\frac{1}{5}\right)$$

Como $\ln(2) > 0$ e $\ln\left(\frac{1}{5}\right) < 0$, tem-se que $\ln\left(\frac{1}{5}\right) \notin]0, +\infty[$ e, portanto, a abcissa do ponto A é igual a $\ln(2)$ e a sua ordenada é igual a $g(\ln(2))$, ou seja, -12 .

Cálculo auxiliar

$$g(\ln(2)) = \frac{5e^{2\ln(2)}}{2} - 11e^{\ln(2)} + \ln(2) - \ln(2) = \frac{5e^{\ln(4)}}{2} - 11 \times 2 = \frac{5 \times 4}{2} - 22 = -12$$

9. Como A e B são pontos do gráfico de f , então $A(a, ka^2)$ e $B(b, kb^2)$, com $a < b$.

O declive da reta AB é dado por $m_{AB} = \frac{kb^2 - ka^2}{b - a} = \frac{k(b^2 - a^2)}{b - a} = \frac{k(b-a)(b+a)}{b-a} = k(b+a)$.

Seja C o ponto do gráfico de f em que a reta tangente ao gráfico é paralela à reta AB , ou seja, $C(c, kc^2)$ tal que $f'(c) = m_{AB}$.

$$f'(c) = m_{AB} \Leftrightarrow 2kc = k(b+a) \Leftrightarrow 2c = b+a$$

$$\Leftrightarrow c + c = b + a$$

$$\Leftrightarrow c - a = b - c$$

Resta-nos provar que $a < c < b$:

Como $2c = b + a$, então $c = \frac{b+a}{2}$.

Verifica-se que:

- $0 < a < b \Rightarrow 0 < a + b < b + b \Leftrightarrow 0 < \frac{a+b}{2} < \frac{2b}{2} \Leftrightarrow 0 < \frac{a+b}{2} < b \Leftrightarrow 0 < c < b$
- $0 < a < b \Rightarrow 0 < a + a < a + b \Leftrightarrow 0 < \frac{2a}{2} < \frac{a+b}{2} \Leftrightarrow 0 < a < \frac{a+b}{2} \Leftrightarrow 0 < a < c$

Como $a < c < b$ e $c - a = b - c$, provámos que as abcissas dos três pontos são termos consecutivos de uma progressão aritmética.