



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
E CIÊNCIA

ESCOLA
SECUNDÁRIA
DE PENAFIEL

Exame Modelo I de Matemática A

Duração do Exame: 150 minutos + 30 minutos de tolerância | junho de 2018

Caderno 1 (75 minutos + 15min) + Caderno 2 (75 minutos + 15min)

12.º Ano de Escolaridade | Turma - G - K

Caderno 1

- **Duração: 75 minutos + 15 minutos de tolerância**
 - **É permitido o uso de calculadora gráfica**
-

Indica de forma legível a versão da prova. A prova é constituída por dois cadernos (Caderno 1 e Caderno 2). Utiliza apenas caneta ou esferográfica de tinta azul ou preta. Só é permitido o uso de calculadora no Caderno 1. Não é permitido o uso de corretor. Risca o que pretendes que não seja classificado. Para cada resposta identifica o item. Apresenta as tuas respostas de forma legível. Apresenta apenas uma resposta para cada item. A prova apresenta um formulário no Caderno 1. As cotações dos itens de cada Caderno encontram-se no final de cada Caderno.

Na resposta aos itens de seleção (escolha múltipla), seleciona a resposta correta. Escreve na folha de respostas o número do item e a letra que identifica a opção escolhida.

Na resposta aos restantes itens, apresenta o teu raciocínio de forma clara, indicando todos os cálculos que tiveres de efetuar e todas as justificações necessárias. Quando, para um resultado, não é pedida aproximação apresenta sempre o valor exato.

Formulário

Geometria

Comprimento de um arco de circunferência:

αr (α - amplitude, em radianos, do ângulo ao centro; r - raio)

área de um polígono regular: $\text{Semiperímetro} \times \text{Apótema}$

área de um setor circular:

$\frac{\alpha r^2}{2}$ (α - amplitude, em radianos, do ângulo ao centro, r - raio)

área lateral de um cone: $\pi r g$ (r - raio da base, g - geratriz)

área de uma superfície esférica: $4\pi r^2$ (r - raio)

Volume da pirâmide: $\frac{1}{3} \times \text{área da base} \times \text{Altura}$

Volume do cone: $\frac{1}{3} \times \text{área da base} \times \text{Altura}$

Volume da esfera: $\frac{4}{3}\pi r^3$ (r - raio)

Progressões

Soma dos n primeiros termos de uma progressão (u_n):

Progressão aritmética: $\frac{u_1 + u_n}{2} \times n$

Progressão geométrica: $u_1 \times \frac{1 - r^n}{1 - r}$, $r \neq 1$

Trigonometria

$\sin(a + b) = \sin a \cos b + \sin b \cos a$

$\cos(a + b) = \cos a \cos b - \sin a \sin b$

Lei dos senos

$$\frac{\sin \hat{A}}{a} = \frac{\sin \hat{B}}{b} = \frac{\sin \hat{C}}{c}$$

Lei dos cossenos ou Teorema de Carnot

$$a^2 = b^2 + c^2 - 2bc \cos \hat{A}$$

Complexos

$(|z| \text{cis} \theta)^n = |z|^n \text{cis}(n\theta)$ ou $(|z| e^{i\theta})^n = |z|^n e^{i(n\theta)}$

$\sqrt[n]{|z| \text{cis} \theta} = \sqrt[n]{|z|} \text{cis} \left(\frac{\theta + 2k\pi}{n} \right)$ ou

$\sqrt[n]{z} = \sqrt[n]{|z|} e^{i \left(\frac{\theta + 2k\pi}{n} \right)}$, $k \in \{0; 1; 2; \dots; n-1\}$ e $n \in \mathbb{N}$

Probabilidades

$$\mu = p_1 x_1 + \dots + p_n x_n$$

$$\sigma = \sqrt{p_1 (x_1 - \mu)^2 + \dots + p_n (x_n - \mu)^2}$$

Se $X \sim N(\mu, \sigma)$, então:

$$P(\mu - \sigma < X < \mu + \sigma) \approx 0.6827$$

$$P(\mu - 2\sigma < X < \mu + 2\sigma) \approx 0.9545$$

$$P(\mu - 3\sigma < X < \mu + 3\sigma) \approx 0.9973$$

Regras de derivação

$$(u + v)' = u' + v'$$

$$(uv)' = u'v + uv'$$

$$\left(\frac{u}{v}\right)' = \frac{u'v - uv'}{v^2}$$

$$(u^n)' = nu^{n-1}u' \quad (n \in \mathbb{R})$$

$$(\sin u)' = u' \cos u$$

$$(\cos u)' = -u' \sin u$$

$$(\tan u)' = \frac{u'}{\cos^2 u}$$

$$(e^u)' = u' e^u$$

$$(a^u)' = u' a^u \ln a \quad (a \in \mathbb{R}^+ \setminus \{1\})$$

$$(\ln u)' = \frac{u'}{u}$$

$$(\log_a u)' = \frac{u'}{u \ln a} \quad (a \in \mathbb{R}^+ \setminus \{1\})$$

Limites notáveis

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n = e \quad (n \in \mathbb{N})$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x} = 1$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x - 1}{x} = 1$$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln x}{x} = 0$$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{e^x}{x^p} = +\infty \quad (p \in \mathbb{R})$$

1. .

1.1	1.2
P2001/2002	PMC2015

1.1. Uma moeda equilibrada é lançada oito vezes

A probabilidade do acontecimento "A face euro sai exatamente cinco vezes" é:

(A) ${}^8C_5 \left(\frac{1}{2}\right)^8$ (B) ${}^8C_5 \left(\frac{1}{2}\right)^5$ (C) ${}^8C_3 \left(\frac{1}{2}\right)^3$ (D) ${}^8C_3 \left(\frac{1}{2}\right)^5$

1.2. No referencial ortonormado xOy , da figura 1, está representada uma elipse de equação $\frac{x^2}{25} + \frac{y^2}{16} = 1$, e um retângulo $[PQRS]$ inscrito na elipse

Sabe-se que:

- P é um ponto da elipse do primeiro quadrante
- $(x; y)$ são as coordenadas do ponto P




Figura 1

Em qual das opções está a expressão que dá a área $(A(x))$ do retângulo, em função da abcissa x do ponto P ?

(A) $A(x) = \frac{16x}{5} \sqrt{25 - x^2}$
(B) $A(x) = \frac{16x}{5} \sqrt{25 + x^2}$
(C) $A(x) = \frac{4x}{5} \sqrt{25 - x^2}$
(D) $A(x) = \frac{2x}{5} \sqrt{25 - x^2}$

2. Considera as funções f e g , de domínio \mathbb{R} , definidas, respetivamente, por $f(x) = 2^{x+1}$ e $g(x) = 2^{-\frac{x}{2}+1}$.

Qual é o conjunto-solução da inequação $g(2x) - f(x) > 0$?

(A) \mathbb{R} (B) \mathbb{R}^+ (C) \mathbb{R}^- (D) \mathbb{R}_0^+

3. Seja $(E, P(E), P)$ um espaço de probabilidade

Sejam A e B dois acontecimentos de $P(E)$, sendo B um acontecimento possível

Pode-se afirmar que:

(A) $P(A | B) + P(\bar{A} | B) = 0.5$
(B) $P(A | B) + P(\bar{A} | B) = 0.6$
(C) $P(A | B) + P(\bar{A} | B) = 0.8$
(D) $P(A | B) + P(\bar{A} | B) = 1$

4. Seja $(E, P(E), P)$ um espaço de probabilidade
Sejam A e B dois acontecimentos possíveis de $P(E)$

Sabe-se que:

- $P(A \cap B) = \frac{1}{5}$
- $P(A \cup B) = \frac{3}{5}$
- $P(\bar{A} | B) = \frac{1}{3}$

Determina $P(B | \bar{A})$

5. No referencial ortonormado $Oxyz$, da figura 2 está representado um sólido $[ABCDEFGH]$

Sabe-se que:

- a origem O do referencial situa-se no centro da face $[ABCD]$
- $[ABCD]$ é um quadrado de lado 6, contido no plano xOy
- as faces $[ABFE]$ e $[CDHG]$ são paralelas ao plano yOz
- $B(3; 3; 0)$, $E(3; -3; 3)$ e $G(-3; 3; 5)$
- uma equação do plano EFG é $x + 3z - 12 = 0$




Figura 2

- 5.1. Vão ser escolhidos três dos oito vértices do sólido. Qual é a probabilidade de definirem um plano paralelo ao plano yOz ? Apresenta o resultado sob a forma de fração irredutível
- 5.2. Determina uma equação vetorial da reta perpendicular ao plano EFG e que contém o ponto D
- 5.3. Escreve a equação do plano mediador do segmento de reta $[AH]$
6. Considera a função g , real de variável real, definida em $] -\infty; -2[$
Na figura 3 estão representados, em referencial o.n. xOy , parte do gráfico da função g e de duas retas r e s
- Sabe-se que:

- as retas s e r , são, respetivamente, a assíntota vertical e a assíntota não vertical ao gráfico da função g , e que I é o seu ponto de interseção

- $\lim_{x \rightarrow -2^-} g(x) = -\infty$
- $\lim_{x \rightarrow -\infty} \left[g(x) - \frac{1}{4}x + \frac{3}{4} \right] = 0$

As coordenadas do ponto I são:

- (A) $\left(-2; -\frac{5}{4}\right)$
- (B) $\left(-2; -\frac{1}{4}\right)$
- (C) $\left(-1; -\frac{5}{4}\right)$
- (D) $\left(-1; -\frac{1}{4}\right)$




Figura 3

7. Considera a função f , real de variável real, definida no seu domínio, por $f(x) = \frac{e^{x+1} - 1}{2e^x - 1}$

7.1. Mostra que a reta de equação $y = \frac{e}{2}$ é assíntota ao gráfico da função, quando $x \rightarrow +\infty$

7.2. Considera a função g , real de variável real, definida no seu domínio, por $g(x) = -\frac{4}{e^x} + f(x)$
Mostra que a função g tem pelo menos um zero em $]1; 2[$

8. Um corpo está suspenso numa mola e oscila verticalmente

Admite que a distância, em decímetros, do corpo ao solo, t segundos após um certo instante t_0 , é dada por $p(t) = 5 + 5e^{-0.2t} \cos\left(\frac{\pi t}{3}\right)$, com $t \in [0; +\infty[$

Na figura 4 está representado, em referencial ortornormado xOy , parte do gráfico da função p




Figura 4

8.1. Determina os instantes em que o corpo se encontra a 5 decímetros do solo, durante os primeiros oito segundos

8.2. Determina $\lim_{t \rightarrow +\infty} p(t)$ e interpreta o valor encontrado, em termos do movimento do corpo

FIM DO CADERNO 1

COTAÇÕES

1.	5 pontos
2.	5 pontos
3.	5 pontos
4.	10 pontos
5.		
5.1	10 pontos
5.2	10 pontos
5.3	10 pontos
6.	5 pontos
7.		
7.1	10 pontos
7.2	10 pontos
8.		
8.1	10 pontos
8.2	10 pontos
	TOTAL	100 pontos

PÁGINA EM BRANCO

Caderno 2

- **Duração:** 75 minutos + 15 minutos de tolerância
 - Neste Caderno não é permitida a utilização de calculadora
-

9. .

9.1	9.2
P2001/2002	PMC2015

9.1. Admite que, numa certa escola, a variável "Massa corporal dos alunos do sexo masculino da escola" segue uma distribuição aproximadamente normal, de valor médio 60 kg

Escolhe-se, ao acaso, um aluno do sexo masculino dessa escola

Relativamente a esse rapaz, qual dos acontecimentos seguintes é o mais provável?

- (A) a sua massa corporal é inferior a 70 kg
- (B) a sua massa corporal é superior a 70 kg
- (C) a sua massa corporal é superior a 55 kg
- (D) a sua massa corporal é inferior a 55 kg

9.2. Na figura 5 está representada a função f , definida por $f(x) = -\frac{\pi}{4} + \arccos\left(-\frac{x}{2}\right)$.

Sabe-se que:

- A é o ponto de interseção do gráfico de f com o eixo das ordenadas;
- B é o ponto do gráfico de f com ordenada $\frac{5\pi}{12}$.

A abcissa do ponto B é:

- (A) 1
- (B) 2
- (C) $\frac{1}{2}$
- (D) $\frac{1}{4}$




Figura 5

10. Em \mathbb{C} , conjunto dos números complexos, considera os números complexos, $w_1 = -2\sqrt{2} \cos\left(\frac{\pi}{4}\right) + 2\sqrt{2}i \sin\left(\frac{\pi}{4}\right)$ e $w_2 = \cos(\theta + \pi) + i \sin(\theta + \pi)$, com $\theta \in \mathbb{R}$

10.1. Considera a condição

$$|z + w_1| = 2 \wedge -\frac{\pi}{2} \leq \text{Arg}(z) \leq -\frac{\pi}{4}$$

No plano complexo, esta condição define uma linha

Determina o comprimento dessa linha

10.2. Mostra que $|w_2^3 + 1| = 2 \left| \sin\left(\frac{3\theta}{2}\right) \right|$

11. Seja g , uma função real de variável real, definida em \mathbb{R}_0^+ , por $g(x) = \begin{cases} x \ln(x) & \text{se } x > 0 \\ 0 & \text{se } x = 0 \end{cases}$

Em qual das opções poderá estar o gráfico da função g ?

(A)




Figura 6

(B)




Figura 7

(C)




Figura 8

(D)




Figura 9

12. Todos os elementos de uma certa linha do Triângulo de Pascal foram escritos em onze bolas, um por bola. Considera a experiência que consiste em retirar, de uma só vez, duas bolas do saco e registar os números. Qual é a probabilidade de os números das duas bolas extraídas serem iguais?

Numa das opções está a expressão que dá o valor dessa probabilidade. Em qual delas?

- (A) $P = \frac{10}{{}^{10}C_2}$
 (B) $P = \frac{5}{{}^{11}C_2}$
 (C) $P = \frac{5}{{}^{10}C_2}$
 (D) $P = \frac{10}{{}^{11}C_2}$

13. Considera dois números reais superiores a um, a e b , com $a \neq b$

Sabe-se que $\log_a(b^3) = 2$

Em qual das opções está o valor de $\frac{\log_b(a^2)}{\log_a(\sqrt{b})}$?

- (A) 9
 (B) 8
 (C) 7
 (D) 6

14. Na figura 10, está representado, num referencial ortonormado xOy , parte do gráfico da função f , definida por

$$f(x) = \begin{cases} \frac{x}{e^{2x} - e^x} & \text{se } x < 0 \\ 0 & \text{se } x = 0 \\ (x+1) \ln\left(\frac{x+2}{x}\right) & \text{se } x > 0 \end{cases}$$




Figura 10

Sabe-se que:

- o eixo das ordenadas é assíntota vertical ao gráfico da função f
- a reta r é assíntota horizontal ao gráfico da função f
- $\lim_{x \rightarrow 0^-} f(x) = b$

14.1. Determina o valor de b

14.2. Considera a sucessão (a_n) , definida por $a_n = \left(\frac{2n+3}{n+1}\right)^n$
Determina $\lim f(a_n)$ e escreve a equação da reta r

15. Considera a função h , real de variável real, definida por

$$h(x) = \begin{cases} \frac{\sin(-2x)(\cos^2(x) - \sin^2(x))}{4x} & \text{se } x < 0 \\ -\frac{k \ln(\sqrt{e})}{2} & \text{se } x = 0 \\ \frac{2x}{1 - e^{4x}} & \text{se } x > 0 \end{cases}, \text{ com } k \in \mathbb{R}$$

15.1. Averigua se existe k , para o qual a função h é contínua em $x = 0$, e em caso afirmativo, indica-o

15.2. Mostra que, se $x > 0$, $h'(x) = \frac{e^{4x}(8x-2)+2}{(1-e^{4x})^2}$, e resolve a equação $h'(x) = \frac{2}{(1-e^{4x})^2}$

15.3. Escreve a equação reduzida da reta t , tangente ao gráfico de h no ponto de abcissa $\frac{1}{4}$

FIM DO CADERNO 2

COTAÇÕES

9.	5 pontos	
10.			
10.1	10 pontos	
10.2	10 pontos	
11.	5 pontos	
12.	5 pontos	
13.	5 pontos	
14.			
14.1	10 pontos	
14.2	10 pontos	
15.			
15.1	15 pontos	
15.2	15 pontos	
15.3	10 pontos	
	TOTAL		100 pontos

PÁGINA EM BRANCO