

TESTE GLOBAL – PROBABILIDADES – 12.º ANO

NOME: _____ N.º: ____ TURMA: ____ ANO LETIVO: ____ / ____

DATA: ____ / ____ / ____

DURAÇÃO DO TESTE: 90 MINUTOS

VERSÃO 2

Na tua folha de respostas, indica de forma legível a versão do teste.

FORMULÁRIO

Probabilidades

$$\mu = p_1x_1 + \dots + p_nx_n$$

$$\sigma = \sqrt{p_1(x_1 - \mu)^2 + \dots + p_n(x_n - \mu)^2}$$

Se X é $N(\mu, \sigma)$, então:

$$P(\mu - \sigma < X < \mu + \sigma) \approx 0,6827$$

$$P(\mu - 2\sigma < X < \mu + 2\sigma) \approx 0,9545$$

$$P(\mu - 3\sigma < X < \mu + 3\sigma) \approx 0,9973$$

GRUPO I

- Os cinco itens deste grupo são de escolha múltipla. Em cada um deles, são indicadas quatro opções, das quais só uma está correta.
- Escreve, na tua folha de respostas, apenas o número de cada item e a letra correspondente à opção que seleccionares para responder a esse item.
- Não presentes cálculos, nem justificações.
- Se apresentares mais do que uma opção, a resposta será classificada com zero pontos, o mesmo acontecendo se a letra transcrita for ilegível.

1. Seja Ω o conjunto de resultados associado a uma experiência aleatória.

Sejam A e B dois acontecimentos ($A \subset \Omega$ e $B \subset \Omega$).

Sabe-se que $P(\overline{A \cup B}) = 0,8$, $P(A) = 0,4$ e $P(\overline{B}) = 0,5$.

Qual é o valor de $P(\overline{A \cup B})$?

- (A) 0,2 (B) 0,3 (C) 0,4 (D) 0,7

2. Considera a linha do triângulo de Pascal cujo penúltimo elemento é 240. Escolhido, ao acaso, um elemento dessa linha, qual é a probabilidade de ser superior a 28680 ?

- (A) $\frac{6}{421}$ (B) $\frac{235}{241}$ (C) $\frac{1}{40}$ (D) $\frac{117}{120}$

3. Do desenvolvimento de $\left(x + \frac{3}{x}\right)^{10}$ resulta um polinómio reduzido.

Qual é o coeficiente do termo independente desse polinómio?

- (A) $243 \cdot {}^{10}C_5$ (B) $10 \cdot {}^{10}C_5$ (C) $3 \cdot {}^{10}C_5$ (D) ${}^{10}C_5$

4. Seja Y uma variável aleatória com distribuição normal de valor médio 19.

Sabe-se que $P(Y \geq 23) = 0,15$.

Qual dos números seguintes pode ser o valor de $P(15 \leq Y \leq 19)$?

- (A) 0,75 (B) 0,68 (C) 0,35 (D) 0,30

5. A tabela de distribuição de probabilidades de uma variável aleatória X é a seguinte:

x_i	0	1	2	3
$P(X = x_i)$	$2c$	c	$2d$	d

Sabe-se que c e d são números reais e que $P(X > 1) = P(X < 2)$.

Qual é o valor médio da variável aleatória X ?

- (A) $\frac{1}{3}$ (B) $\frac{4}{3}$ (C) $\frac{1}{4}$ (D) $c + d$

GRUPO II

Na resposta a cada um dos itens deste grupo, apresenta todos os cálculos que tiveres de efetuar e todas as justificações necessárias.

Atenção: Quando, para um resultado, não é pedida uma aproximação, apresenta sempre o **valor exato**.

1. Um baralho de cartas é constituído por cinquenta e duas cartas em que:

- existem quatro naipes: copas, ouros, espadas e paus;
- cada naipe tem treze cartas, das quais uma é um ás e uma é uma dama;
- as cartas de copas e as cartas de ouros são encarnadas;
- as cartas de espadas e as cartas de paus são pretas.

1.1 Tiram-se, ao acaso, sucessivamente e sem reposição, três cartas do baralho.

Determina a probabilidade de serem tirados o ás de copas e duas damas.

1.2 Escolhem-se, ao acaso, simultaneamente, três cartas do baralho.

Seja X a variável aleatória «número de cartas pretas escolhidas».

Apresenta a tabela de distribuição de probabilidades de X .

Apresenta as probabilidades na forma de fração irredutível.

1.3 Usam-se quaisquer cinco cartas do baralho para se disporem sequencialmente.

Quantas sequências diferentes podemos formar que tenham pelo menos duas damas?

Apresenta uma expressão matemática que seja resposta ao problema. Não calcules o seu valor.

2. Dos alunos de uma turma, sabe-se que:

- 60% frequenta a disciplina de Química;
- dos que frequentam a disciplina de Química, 70% frequentam a disciplina de Física;
- dos que não frequentam a disciplina de Química, 20% frequentam a disciplina de Física.

Determina a probabilidade de um aluno da turma, escolhido ao acaso, frequentar a disciplina de Química, sabendo que não frequenta a disciplina de Física.

Apresenta o resultado na forma de fração irredutível.


3. Seja Ω o conjunto de resultados associado a uma experiência aleatória. Sejam B e C ($B \subset \Omega$ e $C \subset \Omega$) dois acontecimentos independentes, com $P(B) > 0$ e $P(C) > 0$.

Mostra que, para qualquer acontecimento A ($A \subset \Omega$) se verifica a seguinte igualdade:

$$P(A|B) = P(C) \times P(A|(B \cap C)) + P(\bar{C}) \times P(A|(B \cap \bar{C}))$$

4. Na figura ao lado representa-se:

- um referencial o.n. do espaço, com origem em D ;
- o cubo $[ABCDEFGH]$, com 2 unidades de aresta e com uma face contida no plano xOy ;
- a pirâmide $[EFGHV]$, em que a base é uma face do cubo e o vértice V é o centro de outra face do cubo.



Admite que se escolhem, ao acaso, três dos pontos identificados na figura.

4.1 Determina a probabilidade de se escolherem três pontos que definam uma face lateral da pirâmide.

4.2 Sejam M e N os acontecimentos definidos como se segue:

M : «Os pontos escolhidos estão contidos no plano de equação $z = 0$ »

N : «Os pontos escolhidos definem um plano»

Determina o valor de $P(N|M)$, sem recorrer à fórmula da probabilidade condicionada.

A tua resposta deve incluir o significado de $P(X|Y)$ no contexto da situação, a apresentação dos casos possíveis que consideraste, a apresentação dos casos favoráveis e o valor da probabilidade pedida.

5. Na figura ao lado está representado um tabuleiro quadrado, com as casas numeradas de 1 a 16.

Dispomos de oito peças, quatro das quais são brancas e indistinguíveis umas das outras, enquanto as restantes quatro peças têm cores diferentes (amarela, vermelha, azul e preta), sendo, portanto, distinguíveis.

Considera a experiência aleatória que consiste em colocar, ao acaso, as oito peças sobre o tabuleiro, de modo a que cada peça ocupe apenas uma casa.

1	2	3	4
5	6	7	8
9	10	11	12
13	14	15	16

Considera a seguinte questão:

«Qual é a probabilidade de as peças pretas ficarem todas nas casas com números ímpares?»

Uma resposta correta a esta questão é:

$$\frac{{}^8C_4 \times {}^{12}A_4}{{}^{16}A_4 \times {}^{12}C_4}$$

Numa pequena composição, explica as razões que tornam correta a resposta indicada, fazendo referência:

- à lei de Laplace;
- ao número de casos possíveis;
- ao número de casos favoráveis.

FIM

COTAÇÕES

GRUPO I	GRUPO II								TOTAL
	1.1	1.2	1.3	2	3	4.1	4.2	5	
5 x 10 = 50	15	20	20	20	20	15	20	20	200

Proposta de resolução

GRUPO I

1.

$$P(\overline{A \cup B}) = 0,8 \Leftrightarrow P(\overline{A \cap B}) = 0,8 \Leftrightarrow P(A \cap B) = 0,2$$

$$P(\overline{B}) = 0,5 \Leftrightarrow P(B) = 0,5$$

$$P(\overline{A \cup B}) = 1 - P(A \cup B) = 1 - (P(A) + P(B) - P(A \cap B)) = 1 - (0,4 + 0,5 - 0,2) = 0,3$$

Opção B

2. Se o penúltimo elemento da linha é 240, o segundo elemento também; portanto, estamos na linha 240, que tem 241 elementos. Ora, ${}^{240}C_2 = 28680$, pelo que apenas os três primeiros e os três últimos elementos da linha não são superiores a 28680.

Opção B

A probabilidade pedida é, portanto, $\frac{241-6}{241} = \frac{235}{241}$.

3. Os termos do desenvolvimento são da forma ${}^{10}C_p x^{10-p} \left(\frac{3}{x}\right)^p = {}^{10}C_p 3^p \frac{x^{10-p}}{x^p} = {}^{10}C_p 3^p x^{10-2p}$.

Determinemos o valor de p correspondente ao termo independente: $10 - 2p = 0 \Leftrightarrow p = 5$.

O coeficiente do termo independente é, portanto: ${}^{10}C_5 \times 3^5 = 243 {}^{10}C_5$.

Opção A

4.

$$P(Y \geq 23) = 0,15 \Leftrightarrow P(Y \leq 15) = 0,15$$

$$P(15 \leq Y \leq 19) = \frac{1 - [P(Y \geq 23) + P(Y \leq 15)]}{2} = \frac{1 - 2 \times 0,15}{2} = 0,35$$

Opção C

5.

$$P(X > 1) = P(X < 2) \Leftrightarrow P(X = 0) + P(X = 1) = P(X = 2) + P(X = 3) \Leftrightarrow 2c + c = 2d + d \Leftrightarrow c = d$$

Por outro lado, $2c + c + 2d + d = 1 \Leftrightarrow 3c + 3d = 1$. Como $c = d$, $3c + 3c = 1$, donde resulta $c = d = \frac{1}{6}$.

Então, a tabela de distribuição de X é:

x_i	0	1	2	3
$P(X = x_i)$	$\frac{1}{3}$	$\frac{1}{6}$	$\frac{1}{3}$	$\frac{1}{6}$

A média pedida é $0 \times \frac{1}{3} + 1 \times \frac{1}{6} + 2 \times \frac{1}{3} + 3 \times \frac{1}{6} = \frac{4}{3}$.

Opção B

GRUPO II

1.1 Casos possíveis: ${}^{52}A_3 = 132600$; casos favoráveis: ${}^4A_2 \times 1 \times 3 = 36$.

Probabilidade: $\frac{36}{132600} = \frac{9}{33150}$

1.2 Escolhendo ao acaso, simultaneamente, três cartas do baralho, podem ser escolhidas 0 cartas pretas (e 3 encarnadas), 1 carta preta (e 2 encarnadas), 2 cartas pretas (e 1 encarnada) ou 3 cartas pretas (0 encarnadas). Portanto, a variável aleatória X pode tomar os valores 0, 1, 2 ou 3.

$$P(X = 0) = P(X = 3) = \frac{{}^{26}C_3}{{}^{52}C_3} = \frac{2}{17} \quad ; \quad P(X = 1) = P(X = 2) = \frac{{}^{26}C_1 \times {}^{26}C_2}{{}^{52}C_3} = \frac{13}{34}$$

A tabela de distribuição de X é, portanto:

x_i	0	1	2	3
$P(X = x_i)$	$\frac{2}{17}$	$\frac{13}{34}$	$\frac{13}{34}$	$\frac{2}{17}$

1.3 O número de sequências com pelo menos duas damas é igual número total de sequências subtraído do número de sequências com uma ou sem damas.

Número total de sequências: ${}^{52}A_5$

Número de sequências com apenas uma dama ou sem damas: $4 \times 5 \times {}^{48}A_4 + {}^{48}A_5$

Portanto, uma resposta ao problema é: ${}^{52}A_5 - (4 \times 5 \times {}^{48}A_4 + {}^{48}A_5)$

2. Sejam F o acontecimento «o aluno escolhido frequenta Física» e Q o acontecimento «o aluno escolhido frequenta Química». Sabemos que:

- $P(Q) = 0,6$
- $P(F | Q) = 0,7$
- $P(F | \bar{Q}) = 0,2$

Temos que:

- Se $P(Q) = 0,6$, então $P(\bar{Q}) = 0,4$
- Se $P(F | Q) = 0,7$, então $P(\bar{F} | Q) = 0,3$ e, assim:

$$P(Q \cap \bar{F}) = P(Q) \times P(\bar{F} | Q) = 0,6 \times 0,3 = 0,18$$

- Se $P(F | \bar{Q}) = 0,2$, então $P(\bar{F} | \bar{Q}) = 0,8$ e, assim:

$$P(\bar{Q} \cap \bar{F}) = P(\bar{Q}) \times P(\bar{F} | \bar{Q}) = 0,4 \times 0,8 = 0,32$$

- $P(\bar{F}) = P(Q \cap \bar{F}) + P(\bar{Q} \cap \bar{F}) = 0,18 + 0,32 = 0,5$

- Finalmente, $P(Q | \bar{F}) = \frac{P(Q \cap \bar{F})}{P(\bar{F})} = \frac{0,18}{0,5} = \frac{9}{25}$

Portanto, a probabilidade de um aluno da turma, escolhido ao acaso, frequentar a disciplina de Química, sabendo que não frequenta a disciplina de Física, é $\frac{9}{25}$.

3. Sendo B e C independentes, com $P(B) > 0$ e $P(C) > 0$ temos:

$$\begin{aligned}
 P(A|B) &= P(C) \times P(A|(B \cap C)) + P(\bar{C}) \times P(A|(B \cap \bar{C})) \Leftrightarrow \\
 &\Leftrightarrow \frac{P(A \cap B)}{P(B)} = P(C) \times \frac{P(A \cap (B \cap C))}{P(B \cap C)} + P(\bar{C}) \times \frac{P(A \cap (B \cap \bar{C}))}{P(B \cap \bar{C})} \\
 &\Leftrightarrow \frac{P(A \cap B)}{P(B)} = \cancel{P(C)} \times \frac{P(A \cap B \cap C)}{P(B) \times \cancel{P(C)}} + \cancel{P(\bar{C})} \times \frac{P(A \cap B \cap \bar{C})}{P(B) \times \cancel{P(\bar{C})}} \\
 &\Leftrightarrow \frac{P(B \cap A)}{P(B)} = \frac{P(A \cap B \cap C)}{P(B)} + \frac{P(A \cap B \cap \bar{C})}{P(B)} \\
 &\Leftrightarrow P(A \cap B) = P((A \cap B) \cap C) + P((A \cap B) \cap \bar{C}) \\
 &\Leftrightarrow P(A \cap B) = P(A \cap B) \text{ (c.q.d.)}
 \end{aligned}$$

4.1 Casos possíveis: 9C_3 ; casos favoráveis: 4 (das escolhas possíveis, há 4 que definem faces laterais da pirâmide.)

Probabilidade: $\frac{4}{{}^9C_3} = \frac{1}{21}$

4.2 Queremos determinar $P(N|M)$, ou seja, a probabilidade de escolhermos três pontos que definam um plano, sabendo que os pontos escolhidos estão contidos no plano de equação $z = 0$. Trata-se dos pontos A, B, C, D ou V . Temos, assim, 5C_3 casos possíveis. Destes, apenas dois **não** determinam um plano (AVC e DVB). Temos, portanto, ${}^5C_3 - 2$ casos favoráveis.

Probabilidade: $\frac{{}^5C_3 - 2}{{}^5C_3} = \frac{4}{5}$

5. Relativamente aos casos favoráveis, começamos por escolher 4 casas com o número ímpar para colocar as fichas pretas; como há 8 casas com um número ímpar, temos 8C_4 maneiras de o fazer (uma vez que as peças são iguais e as permutações são indistinguíveis). Por cada uma destas maneiras, sobram 12 casas, das quais escolhemos 4 para colocar as peças de outras cores, que ainda podem permutar; temos ${}^{12}A_4$ maneiras de o fazer. Portanto, o número de casos favoráveis é ${}^8C_4 \times {}^{12}A_4$.

Relativamente aos casos possíveis, podemos começar por escolher 4 casas para colocar as peças não pretas, cujas permutações se distinguem; temos ${}^{16}A_4$ maneiras de o fazer. Por cada uma destas maneiras, sobram 12 casas, das quais escolhemos 4 casas para colocar as peças pretas, cujas permutações são indistinguíveis; temos ${}^{12}C_4$ maneiras de o fazer. Portanto, o número de casos possíveis é ${}^{16}A_4 \times {}^{12}C_4$.

Pela lei de Laplace, a probabilidade de um acontecimento é dada pelo quociente entre o número de casos favoráveis a esse acontecimento e o número de casos possíveis da experiência aleatória, com casos elementares equiprováveis, como nesta experiência.

Logo, a probabilidade é dada pelo quociente $\frac{{}^8C_4 \times {}^{12}A_4}{{}^{16}A_4 \times {}^{12}C_4}$.

Critérios específicos de classificação

GRUPO I

1. a 5. (5 x 10 pontos) **50 pontos**

As respostas corretas são as seguintes:

Itens	1	2	3	4	5
Respostas	B	B	A	C	B

GRUPO II

1.1 **15 pontos**

Indicar o número de casos possíveis 5 pontos

Indicar o número de casos favoráveis 6 pontos

Indicar o valor da probabilidade pedida 4 pontos

1.2 **20 pontos**

Indicar os valores que a variável X pode tomar 4 pontos

Determinar cada uma das probabilidades 12 pontos

Apresentar a tabela 4 pontos

1.3 **20 pontos**

Este item pode ser resolvido por, pelo menos, dois processos.

1.º Processo:

Escrever uma expressão que dê o número total de sequências 6 pontos

Escrever uma expressão que dê o número de sequências com apenas uma dama
ou sem damas 10 pontos

Escrever uma expressão que dê o número de sequências com pelo menos
duas damas 4 pontos

2.º Processo:

Escrever uma expressão que dê o número de sequências com exatamente
duas damas 4 pontos

Escrever uma expressão que dê o número de sequências com exatamente
três damas 4 pontos

Escrever uma expressão que dê o número de sequências com exatamente
quatro damas 4 pontos

- Escrever uma expressão que dê o número de sequências com
cinco damas 4 pontos
- Escrever uma expressão que dê o número de sequências com pelo menos
duas damas 4 pontos

2. 20 pontos

- Indicar $P(\bar{Q})$ 1 ponto
- Indicar $P(\bar{F}|Q)$ 2 pontos
- Calcular $P(Q \cap \bar{F})$ 3 pontos
- Indicar $P(\bar{F}|\bar{Q})$ 2 pontos
- Calcular $P(\bar{Q} \cap \bar{F})$ 3 pontos
- Calcular $P(\bar{F})$ 3 pontos
- Reconhecer que $P(Q|\bar{F}) = \frac{P(Q \cap \bar{F})}{P(\bar{F})}$ 3 pontos
- Apresentar o valor da probabilidade pedida 3 pontos

3. 20 pontos

- Aplicar a *fórmula* da probabilidade condicionada 4 pontos
- Reconhecer que $P(B \cap C) = P(B)P(C)$ e que $P(B \cap \bar{C}) = P(B)P(\bar{C})$ 4 pontos
- Simplificar a expressão obtida 1 ponto
- Escrever uma expressão equivalente, sem denominadores 1 ponto
- Aplicar a *propriedade associativa da interseção* 4 pontos
- Aplicar o *teorema da probabilidade total* 4 pontos
- Concluir o que é pedido 2 pontos

4.1 15 pontos

- Indicar o número de casos possíveis 5 pontos
- Indicar o número de casos favoráveis 6 pontos
- Indicar o valor da probabilidade pedida 4 pontos

4.2 20 pontos

Apresentar o significado de $P(N | M)$, no contexto da situação descrita 5 pontos

Indicar o número de casos possíveis 5 pontos

Indicar o número de casos favoráveis 6 pontos

Indicar o valor da probabilidade pedida 4 pontos

5. 20 pontos

Tópicos de resposta:

- explicar o número de casos favoráveis;
- explicar o número de casos possíveis;
- explicar a aplicação da regra de Laplace.

Níveis	Descritores do nível de desempenho	Pontuação
6	Na resposta, são apresentados os três tópicos, com organização coerente dos conteúdos e linguagem científica adequada.	20
5	Na resposta, são apresentados os três tópicos, com falhas na organização dos conteúdos ou na utilização da linguagem científica.	17
4	Na resposta, apenas são apresentados dois dos três tópicos, com organização coerente dos conteúdos e linguagem científica adequada.	14
3	Na resposta, apenas são apresentados dois dos três tópicos, com falhas na organização dos conteúdos ou na utilização da linguagem científica.	11
2	Na resposta, apenas é apresentado um dos três tópicos, com organização coerente dos conteúdos e linguagem científica adequada.	7
1	Na resposta, apenas é apresentado um dos três tópicos, com falhas na organização dos conteúdos ou na utilização da linguagem científica.	5