O que acabámos de exemplificar pode ser simplificado da seguinte maneira:

Em 7, quantas vezes há 3? Há 2.

2x4 são 8, para nove é 1. 2x3 são 6, para sete é 1.

Baixamos o 8.

Em 11, quantas vezes há 3? Há 3.

3x4 são 12. para dezoito são 6. E vai 1.

3x3 são 9, mais 1 são 10, para 11 é 1.

Relativamente à **divisão com decimais**, podes operacionalizar o algoritmo da divisão da mesma maneira, mas tendo em atenção os seguintes aspetos:

- O dividendo não pode ter menos casas decimais do que o divisor. Quando isso acontecer, tens de acrescentar zeros no dividendo de forma a igualar o número de casas decimais do divisor (exemplo **A**);
- No quociente, marcas o número de casas decimais resultante da diferença entre o número de casas decimais do dividendo e do divisor (exemplo **B**);
- No resto, marcas o mesmo número de casas decimais do dividendo (exemplos **A** e **B**).

$$\textbf{A}$$
$$6,4 : 2,16 =$$

$$\begin{array}{r|l} 6,40 & 2,16 \\ 2,08 & 2 \end{array}$$

$$\textbf{B}$$
$$9,34 : 2,5 =$$

$$\begin{array}{r|l} 9,34 & 2,5 \\ 1\ 84 & 3,7 \\ 0,09 & \end{array}$$