e s c o l a superior de
enfermagem
de coimbra

Enfermagem de Saúde Materna e Obstetrícia

Cuidados de Enfermagem à Puérpera

Ano letivo 2016-2017

Unidade Científico-Pedagógica em Enfermagem de Saúde Materna, Obstétrica e Ginecológica

Puerpério

- Do acolhimento à alta -

- Vigiar a adaptação fisiológica e psicológica da puérpera durante o pós parto;
- Identificar desvios relativamente à involução puerperal fisiológica;
- Proporcionar o repouso e bem-estar da puérpera;
- Promover o vínculo afetivo entre pais e filho;
- Facilitar a aprendizagem de habilidades associadas ao papel parental e ao cuidado de si

Puerpério

- Do acolhimento à alta -

FINALIDADE:

- Promoção da autonomia da mulher no pós-parto, quer no seu autocuidado quer nos cuidados a desenvolver ao RN, numa perspectiva assistencial de alta planeada.

Planos de intervenção:

- Cuidados puerperais iniciais nas primeiras 2-6 h
- Cuidados puerperais entre as 6 h-3 dias
- Preparação para a alta.

Acolhimento na unidade após parto

- Instalar a puérpera na unidade e aconselhar repouso até 6h (no parto por via vaginal).
- Vigiar o Globo de Segurança de Pinard/contração uterina, perdas sanguíneas/lóquios.
- Observar ferida cirúrgica/perineorrafia, penso operatório.
- Observar características dos mamilos, se iniciou amamentação ou não.
- Verificar terapêutica prescrita e dados relativos ao parto e nascimento do RN.
- Conhecer antecedentes da gravidez atual, história obstétrica e patologia associada.
- Iniciar plano de cuidados.

Hemorragia

Risco de HEMORRAGIA por atonia uterina

Risco mais elevado na
CESARIANA

Hemorragia

- Monitorizar FC e TA
- Vigiar sinais de hemorragia

Vigiar consistência, tamanho e AFU
Vigiar quantidades de Lóquios sanguíneos
Vigiar penso da ferida cirúrgica

- Executar técnica de expressão uterina, se atonia do útero
- Ensinar sobre medidas de prevenção da atonia uterina

Manter tónus uterino
Evitar globo vesical (retenção urinária)

Retenção Urinária

Vigiar a eliminação urinária →

Vigiar sinais de retenção urinária

.Características da urina

.Sinais de infecção urinária

.Sensação de plenitude (urina de estase) – dupla micção

Estimular a eliminação urinária espontânea

Ensinar sobre sinais de retenção urinária

Ensinar sobre técnica de estimulação da eliminação urinária

Esvaziamento vesical em SOS ↘

.Banho no chuveiro

.Molhar as mãos

.Ouvir água corrente

.Privacidade

.Posicionamento

Função vascular

Risco de TROMBOEMBOLISMO

Vigiar membros inferiores para detetar precocemente sinais de tromboembolismo – **pesquisa sinal de Homan**

DEAMBULAÇÃO PRECOCE

Ferida cirúrgica

- Executar tratamento da ferida cirúrgica abdominal (cesariana)
- Ensinar sobre cuidados à ferida cirúrgica: episiorrafia ou laceração
- Ensinar sobre prevenção de complicações da ferida cirúrgica
- Vigiar a ferida cirúrgica (processo de cicatrização)
- Remover o material de sutura

- **Higiene frequente após cada micção ou dejeção**
- **Ferida limpa e seca**
- **Movimentos únicos no sentido antero-posterior**
- **Mudança frequente de pensos absorventes**
- **Lavar mãos antes e depois da higiene e manipulação de pensos absorventes**
- **Cuidados Vulvoperineais em SOS**

[Auto-controlo da Infeção]

- Incentivar para a disposição de limitar em si próprio comportamentos que levam à transmissão de infeções
- Vigiar sinais e sintomas de infeção

- Gerir um ambiente limpo.
- Orientar a puérpera para o uso de calçado evitando contaminação dos lençóis quando regressa à cama.
- Orientar as puérperas para a importância da higiene – mãos, períneo.
- Consciência coletiva de toda a família da lavagem das mãos para prevenir infeções cruzadas.

[Dor]

- Vigiar dor
- Monitorizar dor através de escala de dor
- Optimizar o ambiente físico
- Aplicar calor
- Aplicar frio
- Executar técnica de massagem
- Executar técnica de distração
- Executar técnica de imaginação guiada
- Executar técnica de relaxamento
- Posicionar a puérpera
- Ensinar sobre auto-controlo: dor

[Dor]

- Gerir a analgesia

Paracetamol

Petidina

Paracetamol

Morfina

[Dor – analgesia epidural]

Dor – analgesia epidural

Dor – analgesia epidural

Algumas considerações sobre Analgesia Epidural:

Manutenção do cateter:

- Logo no acolhimento
- Vigiar penso que cobre local de inserção

Hemorragia
Líquido Cefalorraquidiano
Exteriorização do cateter

- Vigiar filtro do cateter

Presença de sangue
Desconectado

Dor – analgesia epidural

Administração de analgesia:

- Puérpera deitada com cabeceira elevada a 30°
- Máximas condições de assépsia
- Adaptar seringa (sem agulha) ao filtro e aspirar:

-verificar saída de sangue ou líquido
Cefalorraquidiano
-verificar se oferece resistência

- Injetar mistura lentamente (6/6h-8/8h-12/12h)
- Descansar um pouco após administração

Dor – analgesia epidural

Efeitos secundários:

- Prurido (face, generalizado)
- Retenção urinária
- Náuseas e vômitos
- Hipotensão (vigiar TA antes)
- Dispneia
- Depressão respiratória

Antídoto

Naloxona (IV) efeito reversível
após 30 a 45` da administração

Dor – analgesia epidural

Complicações:

- **Cefaleia severa**, por diminuição da pressão intracraniana, secundária à drenagem de líquido cefalorraquidiano
- (provoca dor e vasodilatação). É comum associar-se a náuseas, vertigem, fotofobia ou dor na nuca e ocasionalmente sintomas auditivos e visuais.

Repouso no leito

Aumentar ingestão líquidos

Soros

Cafeína (estimulante/vasoconstritor)

Dor – analgesia epidural

Remoção do cateter:

- Após 48 horas - Uso de técnica asséptica
- Retirar adesivos e penso que cobre local cautelosamente
- Remover cateter lentamente no sentido caudal
- Se oferecer resistência não insistir – flexão pernas e joelhos até ao abdómen
- Verificar se extremidade do cateter está íntegra (azul)
- Verificar local de punção (sinais inflamatórios, líquido cefalorraquidiano, sangue)
- Desinfecção local – penso rápido

Papel Parental

- Promover e incentivar papel parental (adaptação à parentalidade)
- Facilitar a aprendizagem de habilidades para o desempenho do papel parental:
 - Enxoval do bebé
 - Alimentação do filho
 - Gestão do regime terapêutico
 - Cuidados coto umbilical
 - Higiene do RN
 - Choro do RN
 - Características das dejectões
 - Competências do RN
 - Desenvolvimento infantil
 - Icterícia fisiológica
 - Perda de peso fisiológica
 - Posição ao deitar
 - Prevenção de acidentes na criança
 - Transporte do RN

Vinculação

“Ligação entre a criança e mãe e/ou pai; formação de laços afectivos.” (ICN, 2005)

O ser humano tem necessidades de contacto afectivo ao longo da sua vida. Contactos afectivos que lhe dêem segurança, assim como para estabelecer relações afectivas.

Depende deste contacto para o seu desenvolvimento psíquico

Auto-cuidado

- Supervisar o auto-cuidado
- Assistir no auto-cuidado
- Incentivar ao auto-cuidado
- Negociar o auto-cuidado
- Planear o auto-cuidado
- Informar para o auto-cuidado

Auto-cuidado: Alimentar-se

- Providenciar alimentação após o parto
- Hábitos alimentares durante a amamentação.
- Desmistificar mitos/crenças relacionadas com interdição de alimentos durante a amamentação
- Necessidades de hidratação
 - ingestão de líquidos (2500 a 3000 ml)
 - soros em curso nas primeiras 24 horas (3000ml com glicose/24 horas):
- Alimentação progressiva se tolerada

Auto-cuidado: Higiene

- Apoiar a puérpera nas primeiras 48 horas.
- Assistir na higiene geral e vulvoperineal
- Ensinar sobre higiene vulvoperineal
- Assistir a puérpera no vestir e despir
- Auxiliar até que a puérpera seja capaz de demonstrar capacidade de auto-cuidar de si e do recém-nascido.
- Incentivar a iniciativa
- Otimizar pensos absorventes
- Providenciar arrastadeira

Sono e Repouso

- Assistir nos cuidados ao RN
- Ajudar a puérpera a planejar períodos de repouso simultâneos com os do RN
- Adaptar as rotinas hospitalares e planejar a execução das intervenções de enfermagem de acordo com as suas necessidades de sono e repouso (flexibilidade)
- Aliviar a dor
- Gerir ambiente físico – ruído
- Orientar para períodos de repouso em decúbito ventral 2 a 3 vezes por dia, por períodos de uma hora. Para que o útero retome a anteflexão fisiológica.

Atividade física

- Incentivar o levante precoce (6h após parto vaginal ou 12h após cesariana)
- Apoiar o levante
- Vigiar tolerância ao levante (risco de lipotímia)
- Incentivar a deambulação – caminhar com joelhos unidos e arrastar os pés
- Ensinar sobre exercício no pós-parto.

-Pode começar logo a seguir ao nascimento com exercícios simples e progredir gradualmente para outros mais complexos

Exercícios de Kegel
Primeiras 48 horas
Passados 2 a 3 dias

Atividade física

Primeiras 48 horas

Atividade física

Primeiras 48 horas

Atividade física

Primeiras 48 horas

Atividade física

Primeiras 48 horas

Atividade física

Primeiras 48 horas

Atividade física

Passados 2 ou 3 dias

Atividade física

Passados 2 ou 3 dias

Atividade física

Passados 2 ou 3 dias

Atividade física

Passados 2 ou 3 dias

Atividade física

Passados 2 ou 3 dias

Amamentar

- Incentivar a amamentação
- Facilitar o amamentar depois do trabalho de parto
- Ensinar sobre vantagens da amamentação
- Instruir sobre técnica de amamentação

Horário e duração das mamadas
Posicionamento da mãe e RN
Adesão ao mamilo

- Treinar a técnica de amamentação
- Ensinar a mãe sobre sinais de fome do RN
- Ensinar sobre autovigilância da mama

[Lactação]

- Ensinar sobre lactação

Mecanismo da lactação

Características do leite

Alterações que ocorrem na mama durante a amamentação

- Incentivar ingestão de líquidos
- Ensinar sobre hábitos de ingestão de líquidos durante a lactação
- Ensinar sobre hábitos alimentares durante a lactação
- Ensinar sobre hábitos de repouso durante a lactação
- Ensinar sobre prevenção de complicações (hipogaláctea-ingurgitamento-mastite)
- Ensinar sobre relação entre lactação e estilos de vida

Lactação

- Pode ser necessário a supressão da Lactação (Ablactação) quando:

A puérpera decidiu não amamentar

Fator de ordem física o impede

Fator relacionado com o RN

- Neste caso orientar para:

Uso de soutien bem ajustado ou compressão contínua das mamas

Evitar qualquer tipo de estimulação mamária

Maceração e fissura no mamilo

- Vigiar a pele dos mamilos
- Ensinar sobre condições de risco para a maceração e fissura
- Ensinar sobre prevenção de maceração/fissura

Manter pele limpa e seca (troca de discos de proteção)

Higiene diária (não exagerar na higiene)

Proteção dos mamilos com colostro/leite no final de cada mamada

Arejamento natural - “conchas de arejamento”

Duração correta das mamadas e alternância das mamas

Técnica da amamentação correta

Aplicar discos de hidrogel

Aplicar lanolina purificada

Mamilos de silicone em SOS

Pausa em SOS (se sangrantes)

Gelo em SOS

[Ingurgitamento mamário]

- Vigiar lactação
- Ensinar medidas de prevenção
 - Esvaziamento da mama após mamadas.
 - Instruir e treinar sobre técnica de esvaziamento mamário
 - Aplicar gelo após as mamadas do bebê
- Ensinar manobras para facilitar saída do leite
 - Massagem das mamas
 - Aplicação de calor húmido
 - Syntocinon Spray nasal
- Aumentar confiança da mãe – fase transitória.

Mastite

- Cuidados de higiene na manipulação das mamas e mamilos.
- Evitar estase do leite.
- Evitar ingurgitamento mamário.
- Evitar fissura nos mamilos.

Planeamento Familiar

- Aconselhável o reinício das relações sexuais cerca de 4 semanas após o parto
 - Colo útero fechado
 - Cicatrização períneo
 - Ausência de lóquios
- Possibilidade de coito doloroso – uso de lubrificantes
- Ensinar sobre uso de contraceptivos
- Orientar para a consulta de planeamento familiar

O período aconselhado para nova gravidez são 2 anos
A contraceção não deve ter efeitos supressores da lactação

A close-up photograph of a hand with several drawings. On the thumb, there is a large, wide, grinning mouth with a grid pattern. On the index finger, there is a simple smiley face. On the middle finger, there are three dots arranged in a slight curve. On the ring finger, there is another simple smiley face. On the pinky finger, there is a small smiley face. On the palm, the words "HAPPY FAMILY" are written in capital letters, followed by a heart symbol. The background is a plain, light-colored surface.

**Os Enfermeiros existem para
promover a saúde e o bem
estar de todos**